

Des oligo-éléments complexés

Les oligo-éléments d'ASSIMIL K Santé et ASSIMIL K Santé & Silice sont complexés avec un acide organique d'origine végétale (co-produit issu de la transformation du bois-origine France).

ÉLÉMENTS	ASSIMIL K SANTÉ		ASSIMIL K ^{2S} SANTÉ & SILICE	
Teneurs en g/L	Forme sulfate	Pur	Forme sulfate	Pur
Manganèse	250	24.1	250	21.7
Bore	-	3.0	-	2.7
Magnésium	18.5	5.7	16.6	5.1
Zinc	18.4	6.4	16.5	5.7
Cuivre	9.8	3.8	8.8	3.4
Soufre	120	108	40	36

La complexation protège les oligo-éléments, prolonge leur disponibilité.
Elle favorise leur pénétration ainsi que leur assimilation par la plante.

ASSIMIL K Santé et ASSIMIL K Santé & Silice contiennent du manganèse (Mn) et du sélénium (Se)

NEW ASSIMIL K^{2S} Santé & Silice contient Silicium Pro : 10%

c'est à dire ?

Les bénéfices associés des oligo-éléments + Silicium PRO

BÉNÉFICES POUR LA PLANTE	ÉLÉMENTS	RÔLES PRINCIPAUX	Silicium Pro
Photosynthèse	Mg · Mn · Cu	Constitution de la chlorophylle et fonctionnement de l'appareil photosynthétique	✓
Transport des sucres	B	Métabolisme et translocation des sucres dans la plante	
Synthèse des protéines	S · Zn	Constitution des acides aminés soufrés et activation des systèmes enzymatiques	
Équilibre hydrique	B	Régulation des échanges hydriques et limitation des pertes en eau.	✓
Résistance mécanique	B · Cu	Structure des parois cellulaires, synthèse de la lignine et renforcement mécanique	✓
Croissance et enracinement	Zn · Mn · B	Développement végétatif, croissance racinaire et formation des tissus	✓
Tolérance aux stress	Zn · Mn · Cu	Protection des cellules et amélioration de la tolérance aux stress abiotiques	✓

Pour toutes cultures

CULTURE	STADES D'APPLICATION		
Céréales	1er passage au stade 3/4 feuilles	2nd passage tôt à la reprise de végétation	2nd passage tôt à la reprise de végétation
Colza	1er passage au stade 3/4 feuilles	2nd passage tôt à la reprise de végétation	
Maïs	1er passage au stade 5 feuilles	2nd passage au stade 8 feuilles	
Lin	Au stade 2 / 3 feuilles		
Viticulture	Application sur la base de vos pratiques habituelles		
Arboriculture			
Prairies	Après stress liés à la sécheresse		

RETROUVEZ TOUS NOS ITINÉRAIRES TECHNIQUES
www.sidlerconcept.com

Diluer le produit dans le volume d'eau habituel.
Utiliser de préférence une eau non chlorée et déminéralisée.
Ne pas mélanger avec un insecticide, un herbicide ou un fongicide.
Vérifier la compatibilité avant de mélanger avec un engrais foliaire.
Pulvériser sur végétation active, de préférence le matin ou le soir.
Ne pas épandre quand la température est supérieure à 25°.
Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et à une température comprise entre +1° C et + 30° C.

**2.5 L/ha
et par passage**



Conditionnements



Photo non contractuelle - IBC non consignés